



## MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

### KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV-VIII

### UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

### ETAP SZKOLNY 2023/2024

#### Ważne terminy!

Zgodnie z harmonogramem termin ogłoszenia wyników w szkole mija **17.10.2022 r.**

**Najpóźniej do 25.10.2022 r.** należy bezwzględnie wprowadzić wyniki **wszystkich uczniów** na Platformę Konkursów Przedmiotowych. Zgłoszenie uczestników po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęte i **skutkuje ich dyskwalifikacją.**

**08.11.2022 r.** należy zapoznać się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz przekazać informację o ewentualnym zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu konkursu uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym.

Uczeń maksymalnie może zdobyć 20 punktów.

Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego uczeń może otrzymać maksymalnie 1 punkt, a za rozwiązanie zadania otwartego 2 lub 3 punkty. Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania otwartego, inne niż przewidziane w schemacie punktowania rozwiązań, należy przyznać maksymalną liczbę punktów.

## ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA ZADAŃ

### ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

Nr zadania	1.	2.	3.
Maks. liczba punktów	0-1 pkt	0-1 pkt	0-1 pkt
Prawidłowa odpowiedź	B., D.	P., F.	B., D.

### ROZWIĄZANIA ZADAŃ OTWARTYCH

#### Zadanie 4. (0-2 pkt)

W małej sali kinowej wszystkie miejsca są zajęte przez dzieci i dorosłych. W każdym rzędzie siedzi tyle samo dzieci. Liczba dzieci i liczba dorosłych w rzędzie są różnymi liczbami pierwszymi. Rzędów jest tyle, ile miejsc w każdym rzędzie. Wszystkich miejsc jest więcej niż 60, ale mniej niż 100. Oblicz, ile dzieci i ilu dorosłych mogło być w tej sali, jeżeli dzieci było mniej niż dorosłych. Rozpatrz wszystkie możliwości.

Uczeń:	
1. Analizuje treść zadania i zauważa, że widownia jest kwadratem o boku 8 lub 9, a zatem są dwa rozwiązania.	1p.
2. Oblicza, ile jest dzieci i ilu dorosłych w obu przypadkach oraz podaje odpowiedź. Jeśli 8 to: $8 = 3 + 5$ , zatem dzieci było $3 \cdot 8 = 24$ , a dorosłych $5 \cdot 8 = 40$ . Jeśli 9 to: $9 = 2 + 7$ , zatem dzieci było $2 \cdot 9 = 18$ , a dorosłych $7 \cdot 9 = 63$ . Odpowiedź: W sali kinowej mogło być 24 dzieci i 40 dorosłych lub 18 dzieci i 63 dorosłych. <i>Uwaga. Jeśli uczeń rozpatrzy jeden z dwóch przypadków (kwadraty <math>8 \times 8</math>, <math>9 \times 9</math>) lub dodatkowo przypadek kwadratu <math>10 \times 10</math>, to otrzymuje 1p.</i>	1p.

**Zadanie 5. (0-2 pkt)**

Obwody trzech różnych ścian prostopadłościennego wazonu wynoszą: 44 cm, 60 cm, 64 cm. Oblicz, ile pełnych litrów wody można wlać do tego wazonu.

*I sposób*

<p>Uczeń:</p> <p>1. Analizuje treść zadania i oblicza sumę długości trzech różnych krawędzi prostopadłościanu.</p> <p>Połowy obwodów ścian wynoszą odpowiednio: 22 cm, 30 cm i 32 cm.</p> <p>Zatem podwojona suma długości trzech różnych krawędzi jest równa</p> $22 + 30 + 32 = 84 \text{ [cm]},$ <p>a więc suma długości trzech różnych krawędzi wynosi 42 cm.</p> <p>2. Oblicza długości wszystkich krawędzi w decymetrach i pojemność wazonu w litrach oraz podaje odpowiedź.</p> <p>Długości krawędzi to odpowiednio:</p> $42 - 22 = 20 \text{ [cm]} = 2 \text{ dm},$ $42 - 30 = 12 \text{ [cm]} = 1,2 \text{ dm},$ $42 - 32 = 10 \text{ [cm]} = 1 \text{ dm}.$ $V = 1 \cdot 1,2 \cdot 2 = 2,4 \text{ l}$ <p>Odpowiedź: Do wazonu można wlać 2 pełne litry wody.</p>	<p>1p.</p> <p>1p.</p>
--	-----------------------

*II sposób*

<p>Uczeń:</p> <p>1. Analizuje treść zadania, np.: przez zapisanie w postaci równań zależności między długościami krawędzi prostopadłościanu oraz poprawnie oblicza długość przynajmniej jednej krawędzi.</p> $2(a + b) = 44, \text{ to } a + b = 22$ $2(a + c) = 60, \text{ to } a + c = 30$ $2(b + c) = 64, \text{ to } b + c = 32$ $a + b + a + c = 52$	<p>1p.</p>
---	------------

$2a + b + c = 52$ $2a + 32 = 52$ $2a = 20$ $a = 10$ gdzie $a, b, c$ – długości krawędzi prostopadłościanu. 2. Oblicza długości wszystkich krawędzi w decymetrach i pojemność wazonu w litrach oraz podaje odpowiedź. $a = 10$ cm, więc $b = 12$ cm, $c = 20$ cm $a = 1$ dm, $b = 1,2$ dm, $c = 2$ dm $V = 1 \cdot 1,2 \cdot 2 = 2,4$ l Odpowiedź: Do wazonu można wlać 2 pełne litry wody.	1p.
---	-----

**Zadanie 6. (0-2 pkt)**

Zuzia rzuciła 45 razy sześcienną kostką do gry i sumowała liczby wyrzuconych oczek. Czy jest możliwe, żeby suma ta wyniosła 147, jeśli liczb parzystych wypadło dwa razy mniej niż nieparzystych? Odpowiedź uzasadnij.

*I sposób*

Uczeń: 1. Wykonuje analizę zadania i zapisuje występującą w nim zależność, np. w postaci równania. $x$ – liczba liczb parzystych $2x$ – liczba liczb nieparzystych $3x = 45$	1p.
2. Oblicza, ile wypadło liczb parzystych a ile nieparzystych i uzasadnia odpowiedź . $x = 15$ Jest 15 liczb parzystych, ich suma jest liczbą parzystą. Jest 30 liczb nieparzystych, ich suma jest liczbą parzystą. Suma wszystkich liczb jest liczbą parzystą, a zatem nie może wynosić 147.	1p.

*II sposób*

Uczeń: 1. Analizuje treść zadania i zauważa, że suma wyników nieparzystych jest liczbą parzystą: Liczba wyników nieparzystych jest parzysta (bo liczb parzystych jest <b>dwa razy</b> mniej), zatem suma tych wyników jest liczbą parzystą.	1p.
2. Uzasadnia odpowiedź . Suma dowolnej liczby wyników parzystych jest liczbą parzystą, więc suma wszystkich liczb jest liczbą parzystą, a zatem nie może wynosić 147.	1p.

**Zadanie 7. (0-2 pkt)**

Złoty puchar jest o 40% wyższy od srebrnego pucharu. Jeśli srebrny puchar ustawimy na 15-centymetrowym podwyższeniu, to wraz z podwyższeniem będzie wyższy od złotego pucharu o 25%. Oblicz różnicę wysokości tych pucharów (bez podwyższenia).

Uczeń: 1. Zapisuje zależność między wysokościami pucharów w postaci równania np.: $x$ – wysokość srebrnego pucharu $1,4x$ – wysokość złotego pucharu $x + 15 = 1,4x + 0,25 \cdot 1,4x$	1p.
2. Rozwiązuje równanie i oblicza różnicę wysokości tych pucharów oraz podaje odpowiedź. $x + 15 = 1,4x \cdot 1,25$ $x + 15 = 1,75x$ $0,75x = 15$ $x = 20$ [cm] – wysokość srebrnego pucharu $1,4x = 28$ [cm] – wysokość złotego pucharu Odpowiedź: Różnica wysokości tych pucharów wynosi 8 cm.	1p.


**Zadanie 8. (0-3 pkt)**

W prostokącie  $ABCD$  na boku  $AB$  zaznaczono punkt  $K$  tak, że  $\frac{|AK|}{|KB|} = \frac{3}{2}$ , natomiast na boku  $CD$  punkt  $L$  tak, że odcinek  $AL$  jest równoległy do odcinka  $CK$ . Oblicz, jaką część pola prostokąta  $ABCD$  stanowi pole czworokąta  $AKCL$ .

*I sposób*

Uczeń:

1. Przeprowadza analizę zadania i przedstawia ją np. za pomocą rysunku.



2. Zapisuje za pomocą wyrażeń pola czworokątów  $ABCD$  i  $AKCL$ .

$$P_{ABCD} = 5x \cdot y = 5xy$$

$$P_{AKCL} = 3x \cdot y = 3xy$$

3. Oblicza, jaką część pola prostokąta  $ABCD$  stanowi pole czworokąta  $AKCL$ .

$$\frac{P_{AKCL}}{P_{ABCD}} = 3xy : 5xy = \frac{3}{5} = 0,6$$


1p.

1p.

1p.

II sposób

<p>Uczeń:</p> <p>1. Przeprowadza analizę zadania i przedstawia ją np. za pomocą rysunku.</p> <p>2. Zauważa, że stosunek pól prostokąta <math>ABCD</math> i czworokąta <math>AKCL</math> jest równy stosunkowi ich podstaw.</p> <p>Prostokąt <math>ABCD</math> i równoległobok <math>AKCL</math> mają wspólną wysokość <math>BC</math>, a zatem stosunek ich pól jest równy stosunkowi długości podstaw <math>\frac{AK}{AB}</math>.</p> <p>3. Oblicza, jaką część pola prostokąta <math>ABCD</math> stanowi pole czworokąta <math>AKCL</math>.</p> <p>Ponieważ <math>\frac{AK}{KB} = \frac{3}{2}</math>, to <math>\frac{AK}{AB} = \frac{3}{5} = \frac{P_{AKCL}}{P_{ABCD}}</math></p>	<p>1p.</p> <p>1p.</p> <p>1p.</p>
---	----------------------------------



**Zadanie 9. (0-3 pkt)**

Uzasadnij, że jest dokładnie dziesięć dat w roku 2024, które mają tę własność, że numer dnia i numer miesiąca są liczbami nieparzystymi, a ich suma jest liczbą podzielną przez 9. Zapisz te daty.

<p>Uczeń:</p> <p>1. Analizuje treść zadania i ustala, jakimi liczbami może być suma numeru dnia i miesiąca.</p> <p>Sumami numeru dnia i miesiąca mogą być tylko liczby podzielne przez 9 nie większe niż 42 i parzyste, a zatem 18 i 36.</p> <p>2. Wyznacza te sumy, które spełniają warunki zadania dla przynajmniej czterech miesięcy, np.:</p> <p>17 + 1, 15 + 3, 31 + 5, 27 + 9, ... , gdzie pierwszy składnik jest dniem miesiąca, a drugi numerem miesiąca.</p> <p>3. Zapisuje daty roku 2024, o których jest mowa w treści zadania.</p> <p>17 stycznia, 15 marca, 13 maja, 31 maja, 11 lipca, 29 lipca, 9 września, 27 września, 7 listopada, 25 listopada.</p> <p><i>Uwaga. Jeśli uczeń wypisze 10 poprawnych dat bez uzasadnienia, to otrzymuje 2 p.</i></p>	<p>1p.</p> <p>1p.</p> <p>1p.</p>
---	----------------------------------

**Zadanie 10. (0-3 pkt)**

Dwaj bracia, starszy Bartek i młodszy Kuba, trenują bieg na 200 m. W pierwszej próbie wyścigu wygrał Bartek, wyprzedzając Kubę o 40 m (w momencie, gdy Bartek przekraczał metę). W drugiej próbie, aby wyrównać szanse, Bartek rozpoczyna bieg 40 m przed linią startu. Każdy z nich biegnie z taką samą prędkością, jak w pierwszej próbie. Który z braci wygra ten bieg? Odpowiedź uzasadnij.

*I sposób*

<p>Uczeń:</p> <p>1. Zapisuje w postaci wyrażeń prędkości obu braci.</p> $V_B = \frac{200}{t}, \quad V_K = \frac{160}{t}$	1p.
<p>2. Zapisuje w postaci wyrażeń czas obu braci w drugiej próbie biegu.</p> $t_B = \frac{240 \cdot t}{200} = \frac{24}{20} \cdot t, \quad t_K = \frac{200 \cdot t}{160} = \frac{25}{20} \cdot t$	1p.
<p>3. Porównuje czasy obu braci w drugiej próbie biegu i podaje odpowiedź.</p> $t_B < t_K$ <p>Odpowiedź: Wygra Bartek.</p>	1p.

*II sposób*

<p>Uczeń:</p> <p>1. Analizuje treść zadania i oblicza drogę, jaką każdy z braci przebył w tym samym czasie w pierwszej próbie.</p> <p>Bartek przebiega 200 metrów w tym samym czasie, co Kuba 160 metrów, zatem Bartek przebiega 50 m w tym czasie, co Kuba 40 m.</p>	1p.
<p>2. Oblicza, jaką drogę przebyłby Bartek w tym samym czasie, w którym Kuba przebiegnie 200 m.</p> <p>W tym czasie, w którym Kuba przebiegnie 200 m, Bartek przebiegnie 250 m.</p>	1p.
<p>3. Uzasadnia, który z braci wygra bieg.</p> <p>250 m to więcej niż 240 m, jakie ma do przebiegnięcia Bartek, zatem to on wygra.</p>	1p.



*III sposób*

Uczeń:	
1. Analizuje treść zadania i oblicza drogę, jaką każdy z braci przebył w tym samym czasie w pierwszej próbie.	1p.
Bartek przebiega 200 metrów w tym samym czasie, co Kuba 160 metrów.	
2. Zauważa, że wystarczy stwierdzić, który z braci w drugiej próbie szybciej przebiegnie nadwyżkę ponad powyższe wartości.	1p.
Ta nadwyżka jest jednakowa dla obu braci i wynosi 40 m.	
3. Uzasadnia, który z braci wygra bieg.	
Bartek jest szybszy, zatem to on wygra drugą próbę.	1p.