



**KONKURS MATEMATYCZNY**  
**dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego**  
**w roku szkolnym 2018/2019**

**Model odpowiedzi i schematy punktowania**

Za **każde poprawne i pełne** rozwiązanie, inne niż przewidziane w schemacie punktowania rozwiązań zadań, przyznajemy **maksymalną** liczbę punktów.

W zadaniach otwartych (od zad. 5 do zad.12) za zastosowanie w pełni poprawnej metody przyznajemy 1 punkt, zaś za pełne, poprawne rozwiązanie **całego zadania** przyznajemy 2 punkty.

**ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH**

<b>Nr zadania</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>Maks. liczba punktów</b>	<b>1 pkt</b>	<b>1 pkt</b>	<b>1 pkt</b>	<b>1 pkt</b>
<b>Prawidłowa odpowiedź</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>






a stosunek tych ułamków to  $\frac{60}{72}$ ;

2. stwierdza, że w trzecim stopie stosunek ułamków jest mniejszy niż 1, a w pozostałych stopach większy (bo I stop:  $\frac{35}{28} > 1$ , II stop:  $\frac{45}{40} > 1$ , III stop:  $\frac{60}{72} < 1$ ) oraz wnioskuje stąd, że w III stopie jest najmniej srebra.

Odp. Najmniejsza procentowa zawartość srebra jest w III stopie.

*III sposób*

1. analizuje graficznie treść zadania np. rysuje diagram słupkowy danych {7,7}, {9, 10}, {12,18}



tj. I stop: słupek srebra wysokości 7 i obok słupek wysokości 7,

II stop: słupek srebra wysokości 9 i obok słupek wysokości 10,

III stop: słupek srebra wysokości 12 i obok słupek wysokości 18.

2. wnioskuje na podstawie diagramu, gdzie jest najmniej srebra oraz zapisuje odpowiedź.

Odp. Najmniejsza procentowa zawartość srebra jest w III stopie.

### Zadanie 8. (2 pkt)

Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku długości  $a$ . Przekątne dwóch ścian bocznych poprowadzone z jednego wierzchołka tworzą kąt  $60^\circ$ . Wykaż, że jest to sześcian.

Uczeń:

1. uzasadnia, że trójkąt o ramionach będących przekątnymi ścian bocznych jest trójkątem równoramiennym o kącie przy wierzchołku równym  $60^\circ$ , a więc jest to trójkąt równoboczny o długości boku  $a\sqrt{2}$  (przekątna kwadratu o boku  $a$ );

2. oblicza wysokość  $H$  prostopadłościanu (z trójkąta prostokątnego o bokach  $H$ ,  $a\sqrt{2}$ ,  $a$ )

np.  $H^2 = (a\sqrt{2})^2 - a^2$  stąd  $H = a$  i wnioskuje, że ten prostopadłościan jest sześcianem o krawędzi  $a$ .

1p.

1p.

**Zadanie 9.** (2 pkt)

Po torze wyścigowym jeździ kolarz. Jeden pełny obrót pedałem powoduje 4 pełne obroty koła rowerowego. Koło rowerowe ma średnicę 70 cm. Ile pełnych obrotów pedałem wykona kolarz, aby przejechać 1 km? Zakładamy, że kręci pedałami bez przerwy. Wykonaj obliczenia przyjmując, że liczba  $\pi$  jest w przybliżeniu równa  $3\frac{1}{7}$ .

Uczeń:

1. oblicza odległość przy jednym obrocie pedałem  $s_1 \approx 880$  cm;

1p.

2. oblicza liczbę obrotów na trasie 1 km = 100000 cm,  $100000 : 880 \approx 113,6 \approx 114$  obrotów

1p.


Odp. Kolarz wykona 114 pełnych obrotów pedałem.

*Uwaga: dopuszcza się podanie w odpowiedzi liczby 113 jako liczby pełnych obrotów będącej przybliżeniem otrzymanego wyniku z niedomiarem.*

**Zadanie 10.** (2 pkt)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy  $a = 4$  cm oraz wysokości  $H = 4\sqrt{2}$  cm połączono odcinkami środki krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka i otrzymano trójkąt. Wykaż, że jest to trójkąt równoboczny.

Uczeń:



1. analizuje warunki zadania np. oznacza krawędź podstawy graniastosłupa  $a = |AG| = |GH| = |HB| = |AD| = |DC| = |CO| = |OD| = |AO| = 4$  cm i uzasadnia, że  $|EF| = 0,5 |AC|$ , zaś  $|AC|$  równa się podwojonej wysokości trójkąta równobocznego o boku  $a = 4$  cm (bo czworokąt  $AOCD$  jest rombem, więc przekątne dzielą się na połowy, pod kątem prostym) zatem  $|AC| = 4\sqrt{3}$  cm i  $|EF| = 2\sqrt{3}$  cm;

1p.



<p>2. wyznacza pary <math>(5,3)</math>, <math>(5,6)</math>, <math>(10,3)</math>, <math>(10,6)</math> mogące spełniać równość, następnie sprawdza i stwierdza, że <b>nie istnieje</b> całkowite dodatnie rozwiązanie tej równości.</p> <p><i>II sposób</i></p> <p>1. typuje <math>x \leq 10</math> (gdy <math>x \leq 10</math> to <math>3x^2 &lt; 360</math>, zaś dla <math>x = 11</math>, <math>3 \cdot 121 &gt; 360</math>) i <math>y \leq 8</math> (gdy <math>y \leq 8</math> to <math>5y^2 &lt; 360</math>, zaś dla <math>y = 9</math>, <math>5 \cdot 81 &gt; 360</math>) jako możliwy zakres rozwiązań;</p> <p>2. sprawdza przypadki np. dla <math>y = 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1</math> oraz ustala i podaje odpowiedź, że <b>nie istnieje</b> całkowite dodatnie rozwiązanie tej równości.</p>	1p.
--	-----